

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
29 березня 2022 року № 543
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2022 р.
за № 393/37729

ЗМІНИ
до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Доповнити Гігієнічні нормативи і регламенти таблицею 4 такого змісту:

«Таблиця 4

№ з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допустима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень в продуктах харчування, мг/кг (мг/л)		Гранично-допустима концентрація / орієнтовно безпечний рівень впливу в повітрі робочої зони, мг/м3	Гранично-допустима концентрація / орієнтовно безпечний рівень впливу в атмосферному повітрі, мг/м3	Гранично-допустима концентрація / орієнтовно допустимий рівень у воді водойм, мг/дм3	Гранично-допустима концентрація / орієнтовно допустима концентрація у ґрунті, мг/кг	Регламенти безпечного застосування			Клас небезпечності
				культура	максимально допустимий рівень					строки, дні			
										очікування до збору врожаю	виходу на оброблені ділянки		
1	«RembeK ONE» (РембеK ONE) ПР (RB)	ацетаміприд, 1 г/кг	0,01	картопля	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.	4
				томати відкритого та закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)					не потр.	не потр.	не потр.	
				томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				огірки відкритого та закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)					не потр.	не потр.	не потр.	

2	Азорро, КС			Контроль за карбендазимом та азоксистробіном									
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді та грунті)
		азоксистробін , 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	
		азоксистробін , 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		азоксистробін , 100 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	
		азоксистробін , 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ТШХ-0,06)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	7	3	
		азоксистробін , 100 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
3	Акробат МЦ, ВГ			Контроль за диметоморфом, манкоцебом та ETC									2
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	виноград ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	30	7	3	(високостійк ий у воді)
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/	/0,1				

								заг.-сан., орг.					
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	виноградний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01 заг.-сан., орг.	/0,1				
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	картопля ²	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	огірки ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	14	7	3	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.- сан., орг.	/0,1				
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	томати ²	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується	-	-	-	
				виноградний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					-	-	-	
				картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується	-	-	-	

				огірки	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується	-	-	-	
				томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується	-	-	-	
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					-	-	-	
4	АЛГЕБРА (ALGEBRA), KE	клетодим, 360 г/л	0,01	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				ріпак (насіння)	0,15* (межа визн. ТШХ-0,08)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
5	АЛГЕДИ (ALGEDI), PK	дикват дибромід, 300 г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,05)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	0,1 (межа визн. ФМ-0,05)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)					7	не потр.	3	
				соя (олія)	0,1 (межа визн. ФМ-0,05)					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)					7	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
6	Алгоритм (Agorithm), KC			Контроль за епоксиконазолом та карбендазимом		Контроль за епоксиконазолом та тіофанат-метилом		Контроль за епоксиконазолом та карбендазимом					2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		епоксиконазол, 187 г/л +	0,004	зерно хлібних злаків	0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4	30	не потр.	3	

		тіофанат-метил, 310 г/л	0,08		1,0* (межа визн. ТШХ-0,5)	0,1/	/0,01	0,05/орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		епоксиконазо л, 187 г/л +	0,004	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4	30	7	3	
		тіофанат-метил, 310 г/л	0,08		0,5* (межа визн. ТШХ-0,5)	0,1/	/0,01	0,05/орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,06)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
7	Алдака 480 (Aldaka 480, SL), PK	дикамби диметиламінн а сіль, 640,3 г/л (у перерахунку на дикамбу (кислота) - 480 г/л)	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не потр.	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)								
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				землі несільсько-господарського призначення	не потр.*					не потр.	не потр.	3	
8	Алкіон (Alcyon), КС			Контроль за тербутилазином та S-метолахлором									2 (високостійк ий у воді)
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	7	

		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	7	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соє (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
9	Алхімія (Alchemy), КЕ			Контроль за спіроксаміном									2 (високостійк ий у воді та грунті)
		тебуконазол, 167 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не потр.	3	
		тріадименол, 43 г/л +	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ-0,026)	/0,5	/0,01	/0,05 сан.-токс.	0,02/ трансл.				
		спіроксамін, 250 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,03	0,02/ сан.-токс.	/0,4				
		тебуконазол, 167 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	14	7	3	
		тріадименол, 43 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5	/0,01	/0,05 сан.-токс.	0,02/ трансл.				
		спіроксамін, 250 г/л	0,01		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2 небезпечний при	/0,03	0,02/ сан.-токс.	/0,4				

						потраплянні на шкіру							
10	Альbedo (Albedo), KE	хізалофоп- п-стил, 200 г/л	0,01	soя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не потр.	не потр.	3	3
				soя (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
11	Альпака (Alpaca), КС			Контроль за азоксистробіном та ципроконазолом									2 (високостійк ий у воді та грунті)
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	35 (ячмінь)	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	soя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				

		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	соє (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
12	Альтрон, КС	альфа- циперметрин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не потр.	4	З (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					30	не потр.	4	
				ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)					-	-	-	
				соєшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					40	не потр.	4	
				соєшник (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				соє (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					40	не потр.	4	
				соє (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	

				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					30	не потр.	4	
				кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				буряки цукрові	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					30	10	4	
				горох (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					30	10	4	
				яблука	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)					25	10	4	
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)					-	-	-	
13	Альфа- Дикват Форте, РК	дикват дибромід, 300 г/л	0,002	ріпак	0,4 (межа визн. СФ-0,4)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	3	не потр.	2
				ріпак (олія)	0,5 (межа визн. СФ-0,5)					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,4 (межа визн. СФ-0,4)					7	3	не потр.	
				соняшник (насіння)	0,5 (межа визн. СФ-0,05)					6	3	не потр.	
				соняшник (олія)	0,1 (межа визн. СФ-0,05)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5 (межа визн. СФ-0,25)					6	3	не потр.	
				соя (олія)	0,1 (межа визн. СФ-0,05)					-	-	-	

14	Альфа-Мідь, ЗП	міді гідроксид, 770 г/кг	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. атомно-емісійною спектрометрією)	0,5/	0,03 - максимальна разова; 0,005 - середньо-добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
					з індуктивно-зв'язаною плазмою (ААС-ІЗП)-0,028)								
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,016)					-	-	-	
15	Аелас, КЕ			Контроль за міклобутанілом та піраклостробіном									
		міклобутаніл, 250 г/л +	0,03	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	30	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у ґрунті)
		піраклостробін, 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		міклобутаніл, 250 г/л +	0,03	яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	-	-	-	
		піраклостробін, 250 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
16	Антихрущ, КС			Контроль за імідаклопридом та біфентрином									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	виноград	0,07* (межа визн. ТШХ-0,07)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	10	4	
		біфентрин, 100 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	виноградний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	

		біфентрин, 100 г/л	0,02		0,15 (межа визн. ГРХ-0,15)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
17	Ар'єргард, ВГ	римсульфуру н, 250 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002 / заг.- сан.	/0,03	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	на слизові оболонки очей)
18	Аркеро, КС			Контроль за ацетаміпридом та біфентрином									2 (високостійк ий у воді)
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	виноград	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	40	7	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	виноградний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,15 (межа визн. ГРХ-0,15)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				

		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	40	7	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	картопля	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	7	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	20	7	3	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміприд, 375 г/л +	0,01	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 165 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
19	Аргіс Плюс, КС			Контроль за мікробутанілом, тебуконазолом та карбендазимом		Контроль за мікробутанілом, тебуконазолом та тіофанат-метилом		Контроль за мікробутанілом, тебуконазолом та карбендазимом					2 (високостійк ий у воді та грунті)
		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	30	7	3	

		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіофанат- метил, 250 г/л	0,08		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,08)	0,1/	/0,01	0,05/орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.- сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	-	-	-	
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіофанат- метил, 250 г/л	0,08		0,03* (межа визн. ВЕРХ-0,03)	0,1/	/0,01	0,05 / орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,03* (межа визн. ТШХ-0,03)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	30	не потр.	3	
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		0,15** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіофанат- метил, 250 г/л	0,08		0,5* (сума тіофанат- метилу та карбендазим у) (межа визн. ВЕРХ-0,2)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,15 (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				

		міклобутаніл, 125 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.-мігр., фітотокс.	-	-	-	
		тебуконазол, 125 г/л +	0,03		не потр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіофанат- метил, 250 г/л	0,08		не потр.*	0,1/	/0,01	0,05 / орг.	/0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
20	Асистент Максі, КС	ацетаміприд, 400 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	2 (високостійк ий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
21	АС-Кольд Дуо, ТН			Контроль за клотіанідином та альфа-циперметрином									3 (високостійк ий у воді та грунті)
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	не потр. (крім надрання - стиглих столових сортів)	не потр.	не потр.	
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	капуста ²	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	не потр. (крім ранньо- стиглих сортів)	не потр.	не потр.	

		альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005		0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	томати ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	не потр.	не потр.	не потр.	
		альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	-	-	-	
		альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
22	Астрел Макс (Astrel Max), CE			Контроль за ацетохлором та тербутилазином									
		ацетохлор, 450 г/л +	0,001	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	1,0/	/0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.	не потр.	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		тербутилазин, 214 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		антидот АД-67, 45 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ацетохлор, 450 г/л +	0,001	соняшник (олія)	не потр.*	1,0/	/0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.	-	-	-	
		тербутилазин, 214 г/л +	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		антидот АД-67, 45 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ацетохлор, 450 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,008)	1,0/	/0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.	не потр.	не потр.	3	

		тербутилазин, 214 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		антидот АД- 67, 45 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ацетохлор, 450 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	1,0/	/0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.	-	-	-	
		тербутилазин, 214 г/л +	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		антидот АД- 67, 45 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
23	Баскайд, КС			Контроль за піраклостробіном та боскалідом									2
		боскалід, 252 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	35	не потр.	3	(високостійк ий у воді та грунті)
		піраклостробі н, 128 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 252 г/л +	0,04	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробі н, 128 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 252 г/л +	0,04	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	40	не потр.	3	
		піраклостробі н, 128 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 252 г/л +	0,04	ріпак (олія)	не потр.*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробі н, 128 г/л	0,03		0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 252 г/л +	0,04	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	45	не потр.	3	

		піраклостробі н, 128 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 252 г/л +	0,04	соє (олія)	не потр.*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробі н, 128 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
24	БЕЛЕМ 08 МГ	циперметрин, 8 г/кг	0,003	картопля ²	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,04 - максимальна разова; 0,01 - середньо- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.	20	7	3	2
				томати ²	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)					20	7	3	
				томатний сік	не потр.*					-	-	-	
				газони	не потр.*					не потр.	7	3	
25	Біошок, КС	хлорокис міді, 340 г/л	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; межа визначення методом атомно- адсорбційної спектроскопії (далі - ААС)- 0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС-0,5)					-	-	-	
26	Вайбранс Преміум 90 FS, TH			Контроль за седаксаном та флудіоксонілом									
		седаксан, 40 г/л +	0,1	картопля	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,03	0,004/ заг.-сан.	/0,2	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостійк ий у воді)
		флудіоксоніл, 50 г/л	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
27				Контроль за ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином									

	ВАМП ДУО 220, КС	ацетаміприд, 115 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	4	2 (високостійк ий у воді)
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	4	
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л +	0,01	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	45	10	4	
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 115 г/л +	0,01	яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
28	Вантакор, КС	хлорантранілі -прол, 600 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді та грунті)

				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
29	ВАСП, ВІ	ацетаміприд, 700 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	2 (високостійк ий у воді)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)						не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
30	Віоліс, КС	хлорокис міді, 350 г/л	0,05 (по міді)	яблука ²	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,028)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	3
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,016)					-	-	-	
31	Геліос Максі, РІ	амонійна сіль гліфосату, 757 г/кг, у кислотному еквіваленті - 680 г/кг	0,01	обробка земель, відведених під пари; обробка полів, призначених під посів сільськогос- подарських культур	не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не потр.	7	3	3 (високостійк ий у воді)
32	Гемблер, КС			Контроль за азоксистробіном та ципроконазолом									2 (високостійк ий у воді та грунті)
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	35	не потр.	4	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				

		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	35	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
33	Геокс 50 WG, ВГ	флудіоксоніл, 50 г/л	0,015	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	20	7	3	2
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				груші	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					20	7	3	
				грушевий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				персики	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					20	7	3	
				периковий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
34	Гліфа 480 SL, РК	гліфосату ізопропіламінн а сіль, 480 г/л	0,01	осіння післязбиральна та весняна передпосівна обробка сільсько- господарських угідь, землі несільсько- господарського призначення	не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не потр.	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
35	ГрінДжент (Green- Giant), KE	піраклостробі н, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)

36	Грифон, КС	оксихлорид міді, 239,36 г/л + гідроксид міді, 236,64 г/л, в перерахунку на чисту металеву мідь, 272 г/л)	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,028)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо-добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	2
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,016)					-	-	-	
				виноград	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,028)					30	7	3	
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,016)					-	-	-	
				томати	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,028)					14	7	3	
				томатний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,016)					-	-	-	
				горіх волоський (ядро)	20,0* (межа визн. ААС-ІЗП-0,1)					35	7	3	
37	Дефіс, СК			Контроль за диметоморфом та флуазинамом									3 (високостійкий у воді)
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	томати	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 небезпечний при	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				

						потраплянні на шкіру							
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	виноград	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	виноградний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	цибуля (ріпка)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/заг.-сан.	/0,04	30	7	3	
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/заг.- сан.	/0,2				
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	картопля	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
38	Джаванто, КС			<i>Контроль за спіротетраматом та абамектином</i>									
		спіротетрамат , 100 г/л +	0,01	яблука	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	20	7	3	2
		абамектин, 20 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				

		спіротетрамат , 100 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат , 100 г/л +	0,01	томати	1,0 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	20	7	3	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		0,005 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат , 100 г/л +	0,01	томатний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат , 100 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,9 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	50	не потр.	3	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіротетрамат , 100 г/л +	0,01	соя (олія)	0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,4)	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-	
		абамектин, 20 г/л	0,0002		не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
39	Джалентра , КС			Контроль за хлорантраніпролом та біфентрином									2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійки й у воді та грунті)
		хлорантранілі -прол, 106 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 159 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі -прол, 106 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	

		біфентрин, 159 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі -прол, 106 г/л +	0,02	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 159 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі -прол, 106 г/л +	0,02	соє (олія)	не потр.*	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 159 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі -прол, 106 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	3	
		біфентрин, 159 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		хлорантранілі -прол, 106 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.*	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 159 г/л	0,02		не потр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
40	Дімілін 480, КС	дифлубензуро н, 480 г/л	0,020	яблука	0,05 (межа визн. ТШХ-0,03)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	30	3	1	3
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				капуста	0,05 (межа визн. ГРХ-0,02- 0,05)					40	3	1	
				соняшник (насіння)	0,15 (межа визн. ГРХ-0,08)					30	не потр.	3	

				соляшник (олія)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				соя (олія)	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
41	Дінта, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	соляшник (насіння)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.	30	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
				соляшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
42	Елатус РІА 358 ЕС, КЕ			Контроль за пропіконазолом та солатенолом									2
		пропіконазол, 208,33 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не потр.	3	(небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високостійки й у воді та грунті)
		солатенол, 83,3 г/л +	0,01		0,04** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,1	/0,002	0,001/	/0,03				
		ципроконазол, 66,67 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
43	Ельбрус, КС			Контроль за тіаметоксамом та лямбда-цигалотрином									2
		тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	4	(небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				

44	Етасил, ВГ	етаметсуль- фурон-метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,7	/0,006	0,015/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
45	Етафорон, ВГ	етаметсульфу- рон-метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,7	/0,006	0,015/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
46	Захисник Екстра, КС			<i>Контроль за карбендазимом (сумою тіофанат-метилу і карбендазиму) та флутріафолом</i>		<i>Контроль за тіофанат-метилом та флутріафолом</i>			<i>Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом, флутріафолом</i>				3 (високостійк ий у воді та грунті)
		тіофанат- метил, 310 г/л +	0,08	виноград	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	7	3	
		флутріафол, 190 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат- метил, 310 г/л +	0,08	виноградний сік	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	

		флутріафол, 190 г/л	0,01		0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
47	Імамекс, 40 SL, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
48	Імацид Актив, ЕВ			<i>Контроль за імазамоксом та хізалофоп-п-тефурилом</i>									3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
		імазамокс, 38 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не потр.	не потр.	3	
		хізалофоп- п-тефурил, 30 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
		імазамокс, 38 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		хізалофоп- п-тефурил, 30 г/л	0,005		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,2	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
49	Імідаголд, РК	імідаклоприд, 200 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не потр. (перед- посівна обробка насіння); 30 (обробка по вегетації)	не потр.	3	2 (високостійк ий у воді)
				соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					-	-	-	
				соняшник (олія)	не потр.								

				ріпак (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				ріпак (олія)	не потр.								
50	Іназума, ВГ			<i>Контроль за ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином</i>									
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	кукурудза ¹ (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	35	не потр.	4	2 (високостійк ий у воді)
		лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 30 г/кг	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
51	Інверт, КЕ	абамектин, 20 г/л	0,0002	яблука	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)					30	не потр.	3	
				соя (олія)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
52	Інспір Голд, КЕ			<i>Контроль за тебуконазолом, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)</i>									3 (високостійк ий у воді)
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	40	не потр.	3	

		протіоконазол , 100 г/л	0,001		0,1* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				
53	К1, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.	30	не потр.	3	2 (високостійк ий у воді)
					ріпак (олія)	не потр.*				-	-	-	
54	Камзол Турбо, КС			Контроль за ципроконазолом та метконазолом									2 (високостійк ий у воді та грунті)
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	30	не потр.	3	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	соляшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	30	не потр.	3	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,2 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	соляшник (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	-	-	-	
		метконазол, 60 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	30	не потр.	3	
		метконазол, 60 г/л	0,001		0,2 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	ріпак (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	-	-	-	
		метконазол, 60 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	30	не потр.	3	

		метконазол, 60 г/л	0,001		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		ципроконазол, 80 г/л +	0,002	соє (олія)	не потр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	-	-	-	
		метконазол, 60 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
55	Кандопа (Candopa), КЕ			<i>Контроль за сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти в перерахунку на трінексапак-етил</i>		<i>Контроль за трінексапак-етилом</i>		<i>Контроль за сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти в перерахунку на трінексапак-етил</i>					3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
		трінексапак- етил, 250 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
56	Карате Зеон 050 CS, СК	лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	30	не потр.	4	2
				соє (олія)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					-	-	-	
57	Катадін, КЕ			<i>Контроль за ацетаміпридом та емаектин бензоатом</i>									3 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки очей, (високостійк ий у воді)
		ацетаміприд, 6,4% +	0,01	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	14	не потр.	3	
		емаектин бензоат, 4,8%	0,001		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3				
		ацетаміприд, 6,4% +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		емаектин бензоат, 4,8%	0,001		не потр.*	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3				
		ацетаміприд, 6,4% +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	40	не потр.	3	

		емамектин бензоат, 4,8%	0,001		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3				
		ацетаміприд, 6,4% +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		емамектин бензоат, 4,8%	0,001		не потр.*	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3				
58	Квікфос, ТБ			<i>Контроль за фосфіном</i>									1 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
		фосфід алюмінію, 560 г/кг		зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. індикаторним и трубками- 0,007)	0,1/	0,01 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	0,005/ сан.-токс.	/0,4	20 ≤ МДР	5–10 < ГДК	5–10 < ГДК	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. індикаторним и трубками- 0,007)					20 ≤ МДР	5–10 < ГДК	5–10 < ГДК	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. індикаторним и трубками- 0,007)					20 ≤ МДР	5–10 < ГДК	5–10 < ГДК	
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. індикаторним и трубками- 0,007)					20 ≤ МДР	5–10 < ГДК	5–10 < ГДК	
				обробка лісу (деревини) в трюмах суден, контейнерах, складах; знезараження незавантажених складських приміщень						-	5–10 < ГДК	5–10 < ГДК	
59				<i>Контроль за фамоксадоном та цимоксанілом</i>									

	Керамокс Екстра (Ceramox XTRA), ВГ	цимоксаніл, 250 г/кг +	0,05	картопля	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	20	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		фамоксадон, 250 г/кг	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
60	Клефандим , КЕ	клетодим, 240 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,15* (межа визн. ТШХ-0,08)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1 (межа визн. ТШХ-0,05)					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,02)					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не потр.	7	3	
61	Колізей, ТН	тіаметоксам, 350 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостійк ий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
62	Кордус Флекс, ВГ			Контроль за дикамбою									3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
		дикамби натрієва сіль, в перерахунку на дикамбу, 561,5 г/кг +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ, ВЕРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не потр.	не потр.	3	
		римсульфу рн, 31,3 г/кг +	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		нікосульфуро н, 62,5 г/кг +	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				

		антидот ізоксадифен- етил, 31,25 г/кг	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		дикамби натрієва сіль, в перерахунку на дикамбу, 561,5 г/кг +	0,004	кукурудза (олія)	не потр.	1,0/ 	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	-	-	-	
		римсульфу- ро н, 31,3 г/кг +	0,02		не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		нікосульфуро н, 62,5 г/кг +	2,0		не потр.	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		антидот ізоксадифен- етил, 31,25 г/кг	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
63	Кудос, ВГ	прогексадіон кальцію, 100 г/кг	0,02	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,2	30	7	3	2
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
				груші	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,2	30	7	3	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
64	Кураж, КС	хлорантранілі -прол, 200 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	20	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді та грунті)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соняшник ¹ (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	

				соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					35	не потр.	3	
				соє (олія)	не потр.*					-	-	-	
				яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					25	не потр.	3	
				яблучний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					-	-	-	
				виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					45	не потр.	3	
				виноградний сік	не потр.*					-	-	-	
65	Лаготрин, СК	лямбда- цигалотрин, 250 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				2
				кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					30	не потр.	4	
				кукурудза (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	4	
				соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	4	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
66	Лайвіг, ТН			Контроль за дифеноконазолом, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)									3 (високостійк ий у воді)
		протіоконазол , 50 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)	не потр.	не потр.	не потр.	

		дифеноконазо л, 50 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		піраклостробі н, 25 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
67	Лірум 78 SC, KC			<i>Контроль за циантраніліпролом</i>									
		абамектин, 18 г/л +	0,0002	капуста	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	2
		циантранілі- прол, 60 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3				
		абамектин, 18 г/л +	0,0002	цибуля (ріпка)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	14	7	3	
		циантранілі- прол, 60 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3				
				<i>Контроль за дифлюфеніканом та флуфенацетом</i>									2 (високостійк ий у воді та грунті)
68	Леноцет Плюс (Lenocet Plus), KC	дифлюфеніка н, 100 г/л +	0,05	зерно хлібних злаків	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5	/0,001	/0,15 сан.-токс.	/0,15	не потр.	не потр.	3	
		флуфенацет, 400 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,001	0,002/ заг.-сан., сан.-токс.	/0,2				
69	Лентагран 600 EC, KE	піридат, 600 г/л	0,002	сорго (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не потр.	3	не потр.	3
70	Лонгас, KC			<i>Контроль за гекситіазоксом та абамектином</i>									
		абамектин, 70 г/л +	0,0002	яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	2
		гекситіазокс, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
		абамектин, 70 г/л +	0,0002	яблучний сік	не потр.*	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	

		гекситаіазокс, 180 г/л	0,04		не потр.*	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1				
71	Луазит, КЕ	флуазифоп- п-бутил, 150 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не потр.	не потр.	3	3
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (насіння)	не потр.*					-	-	-	
72	Максентіс, КС			Контроль за азоксистробіном, протіоконазолом-дестіо (1) та протіоконазолом (2)									2
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	(високостійк ий у воді)
		протіоконазол , 150 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не потр.	3	
		протіоконазол , 150 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		протіоконазол , 150 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не потр.	3	
		протіоконазол , 150 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		протіоконазол , 150 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				

		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	
		протіоконазол , 150 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
73	Малахіт, КС	дитіанон, 250 г/л +	0,01	яблука ²	3,0** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,5 подразнює шкіру	/0,01	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	2 (алерген, небезпечний при по потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
		піриметаніл, 250 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,04/ сан.-токс.	/0,3				
		дитіанон, 250 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/0,5 подразнює шкіру	/0,01	0,06/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		піриметаніл, 250 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,02	0,04/ сан.-токс.	/0,3				
74	Маргас, ТН	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостійк ий у воді)
75	Мега Дикват, РК	дикват дибромід, 374 г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,05)	0,05/ небезпечний при по потраплянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	не потр.	3	3 (небезпечний при по потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	0,1 (межа визн. ФМ-0,05)					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)					7	не потр.	3	
				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,025)					7	не потр.	3	
76	Меганік, КЕ			<i>Контроль за дифеноконазолом, протіоконазолом-дестіо (1) та протіоконазолом (2)</i>									3 (високостійк ий у воді та грунті)
		дифеноконазо л, 125 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не потр.	3	
		протіоконазол , 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				

		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	50	не потр.	3	
		протіокназол , 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		протіокназол , 175 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	50	не потр.	3	
		протіокназол , 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		протіокназол , 175 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	
		протіокназол , 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
77	Мезоген (Mezogen, SC), КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	2 (високостійк ий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
78	Мезонік, МД			Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном									3 (високостійк ий у воді)
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ (сан.-токс.)	/0,4	не потр.	не потр.	3	
		нікосульфуро н, 30 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ (заг.-сан.)	/0,2				

		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ (сан.-токс.)	/0,4	-	-	-	
		нікосульфуро н, 30 г/л	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ (заг.-сан.)	/0,2				
79	Мезонікс, МД			Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном									3 (високостійк ий у воді)
		мезотріон, 100 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	
		нікосульфуро н, 40 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		мезотріон, 100 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
		нікосульфуро н, 40 г/л	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
80	Мезонік- Стар, МД			Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном									3 (високостійк ий у воді)
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	
		нікосульфуро н, 30 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001 / заг.- сан.	/0,2				
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
		нікосульфуро н, 30 г/л	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001 / заг.- сан.	/0,2				
81	Мекар, МЕ	абамектин, 18 г/л	0,0002	яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	14	7	3	2 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
				виноград	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)					14	7	3	

				виноградний сік	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					14	7	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
82	Мелоді Компакт 49 WG, ВГ			Контроль за міддю та іпровалікарбом									3 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	виноград	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо-добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо-добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	-	-	-	
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	томати	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо-добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	20	7	3	
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	томатний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо-добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	-	-	-	

		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
		оксихлорид міді, 406 г/кг +	0,05 (по міді)	цибуля (ріпка)	5,0* (межа визн. ФМ-2,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	
		іпровалікарб, 84 г/кг	0,005		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,007/ заг.-сан.	0,6/ (трансл., водно-мігр.)				
83	Мерівон Про, КС			Контроль за флуксапіроксадом та піраклостробіном									2
		флуксапірокса д, 250 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	не потр.	не потр.	не потр.	(високостійк ий у воді та грунті)
		піраклостробі н, 250 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		флуксапірокса д, 250 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.*	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		піраклостробі н, 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
84	Мілан 40, МД	нікосульфуро н, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
85	Міравіс Дуо 200 SC, КС			Контроль за адепідіном (підіфлуметофеном) та дифенокназолом									3
		адепідин™ (підіфлу- метофен), 75 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,04 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	0,06/ водн.-мігр.	30	не потр.	3	(високостійк ий у воді та грунті)
		дифенокназол, 125 г/л	0,002		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		адепідин™ (підіфлу- метофен), 75 г/л +	0,03	соя (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	0,06/ водн.-мігр.	-	-	-	

		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,02 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
86	Міравіс Ейс 275 SE, СЕ			Контроль за аденідином (підіфлуметофеном) та пропіконазолом									2
		адепідин™ (підіфлуметофен), 150 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,03 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	0,06/ водн.-мігр.	30 (пшениця) ; 35 (ячмінь)	не потр.	3	(високостійкий у воді та ґрунті)
		пропіконазол, 125 г/л	0,040		0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
87	Місол 100 FS, TH			Контроль за протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)									2
		протіоконазол , 100 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)	не потр.	не потр.	не потр.	(алерген, високостійкий у воді)
88	Моддус Старт 250 DC, КД	тринексапакетил, 250 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	30	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
89	Напалм Супер, РК	гліфосату калійна сіль, 663 г/л	0,01	кукурудза ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	14 (десикант)	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					14 (десикант)	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
				виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не потр.	не потр.	3	
				виноградний сік	не потр.*					-	-	-	
				яблука	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не потр.	не потр.	3	

				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
				обробка полів, призначених під посів сільськогосподарсь ких культур; земель, відведених під пари; земель несільськогос- подарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафто- проводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)						не потр.	не потр.	3	
90	Нікоцид Тотал, МД			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2- етилгексиловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					3 (високостійк ий у воді)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 470 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не потр.	не потр.	3	
		флорасулам, 5,5 г/л +	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		нікосульфуро н, 90 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 470 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 5,5 г/л +	0,05		не потр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		нікосульфуро н, 90 г/л	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				

91	Оберон Рapid 240 SC, KC			Контроль за спіромезифеном									
		спіромезифен, 228,6 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,8	/0,002	0,0002/ заг.-сан.	/0,4	30	не потр.	3	2
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіромезифен, 228,6 г/л +	0,01	соняшник (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,8	/0,002	0,0002/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіромезифен, 228,6 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,8	/0,002	0,0002/ заг.-сан.	/0,4	30	не потр.	3	
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
		спіромезифен, 228,6 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,8	/0,002	0,0002/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		абамектин, 11,4 г/л	0,0002		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
92	Обсютен Супер, КЕ	феноксапроп- п-етил, 140 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,6	/0,002	0,0003/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
		антидот клоквінтосет- мексил, 47 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
93	Орвего, KC			Контроль за аменоктрадином та диметоморфом									
		аметоктрадин, 300 г/л +	0,2	картопля ²	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,02	0,005/ заг.-сан.	/0,6 водн.-мігр.	20	7	3	3 (високостійк ий у воді)

		диметоморф, 225 г/л	0,1		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		аметоктрадин, 300 г/л +	0,2	огірки ²	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,02	0,005/ заг.-сан.	/0,6 водн.-мігр.	20	7	3	
		диметоморф, 225 г/л	0,1		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		аметоктрадин, 300 г/л +	0,2	томати ²	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,02	0,005/ заг.-сан.	/0,6 водн.-мігр.	20	7	3	
		диметоморф, 225 г/л	0,1		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		аметоктрадин, 300 г/л +	0,2	томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,02	0,005/ заг.-сан.	/0,6 водн.-мігр.	-	-	-	
		диметоморф, 225 г/л	0,1		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
94	Парма, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексисловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					3
		2,4-Д 2-етил-гексисловий ефір, 452 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не потр.	не потр.	3	
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		2,4-Д 2-етил-гексисловий ефір, 452 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	не потр.*	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		не потр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
95	Петра (Брод-страйк, Пігон), ВГ	флуметсулам, 800 г/кг	0,2	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітотокс., водно-мігр., трансл.	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)

				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
96	Піраклін, КЕ	піраклостробі н, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	35	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					40	не потр.	3	
				ріпак (олія)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					45	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					40	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					35	не потр.	3	
97	Пірівіо, ВГ	тіаметоксам, 250 г/л	0,02	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	2
98	Пончо Вотіво 610 FS, TH			Контроль за клотіанідином									
		клотіанідин, 508 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостійк ий у воді та грунті)
		Bacillus firmus, 102 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		клотіанідин, 508 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл., фітотокс.	-	-	-	

		Bacillus firmus, 102 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
99	Президент, КС			Контроль за імідаклопридом, ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином									3 (високостійкий у воді)
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	35	не потр.	4	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не потр.	4	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не потр.	4	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				

		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 140 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		ацетаміприд, 160 г/л +	0,01		не потр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
100	Пріаксор, КЕ			Контроль за флуксапіроксадом та піраклостробіном									2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		флуксапіроксид, 75 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	
		піраклостробін, 150 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		флуксапіроксид, 75 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		піраклостробін, 150 г/л	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
101	Продезин Комплекс, ТН			Контроль за імідаклопридом, ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		імідаклоприд, 250 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	не потр.	
		прохлораз, 150 г/л +	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3				
		тебуконазол, 30 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				

10 2	Пропігерб, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
10 3	Пропізоцид , СЕ			Контроль за прометрином та пропізохлором									2 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки очей, високостійки й у воді та грунті)
		прометрин, 200 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не потр.	не потр.	3	
		пропізохлор, 200 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
		прометрин, 200 г/л +	0,005	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	-	-	-	
		пропізохлор, 200 г/л	0,01		не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
10 4	Пумс, ЕВ			Контроль за феноксапроп-п-етиом									3 (високостійк ий у воді)
		феноксапроп- п-етил, 69 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ТХШ, ВЕРХ-0,2)	/0,6	/0,002	0,0003/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	

		антидот мефенпідіети л, 75 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
10 5	Разит, КС			Контроль за ацетаміпридом та імідаклопридом									3 (високостійк ий у воді)
		альфа- циперметрин, 100 г/л +	0,005	яблука	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	10	4	
		іміаклоприд, 140 г/л +	0,06		0,07* (межа визн. ВЕРХ-0,07)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		ацетаміприд, 160 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		альфа- циперметрин, 100 г/л +	0,005	яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
		іміаклоприд, 140 г/л +	0,06		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		ацетаміприд, 160 г/л	0,01		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
10 6	Ревікер, КЕ			Контроль за мефентрифлуконазоом та піраклостробіном									3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійки й у ґрунті)
		мефентрифлу- коназол, 100 г/л +	0,035	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/05	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,08	30	не потр.	3	
		піраклостробі н, 100 г/л	0,03		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
10 7	Ревістар, КЕ			Контроль за мефентрифлуконазолом та флуксапіроксадом									2 (небезпечний)

		мефентрифлу- коназол, 100 г/л +	0,035	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,0016)	0,001/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,0008)	/0,08 (межа визн. ВЕРХ-0,04)	30	не потр.	3	при попаданні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійки й у воді та грунті)
		флуксапірокса л, 50 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3				
10 8	Реглон Ейр 200 SL, РК	дикват іон, 200 г/л	0,002	ріпак (насіння)	0,4 (межа визн. СФ-0,4)	0,05/ (небезпечни й при потраплянні на шкіру)	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				ріпак (олія)	0,5 (межа визн. СФ-0,5)					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,5 (межа визн. СФ-0,05)					6	не потр.	3	
				соняшник (олія)	0,1 (межа визн. СФ-0,05)					-	-	-	
10 9	Релеванс, КС			Контроль за карбендазимом (сумою тіофанат-метилу та карбендазиму) та цимоксанілом		Контроль за тіофанат-метилом та цимоксанілом		Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом та цимоксанілом					3 (високостійк ий у воді)
		тіофанат- метил, 375 г/л +	0,08	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не потр.	3	
		цимоксаніл, 225 г/л +	0,05		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				
		продукт ферментації Актиноміцеті в spp., 5 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				

		тіофанат-метил, 375 г/л +	0,08	соя (олія)	не потр.*	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	
		цимоксаніл, 225 г/л +	0,05		не потр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				
		продукт ферментації Актиноміцеті в спп., 5 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат-метил, 375 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не потр.	3	
		цимоксаніл, 225 г/л +	0,05		0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				
		продукт ферментації Актиноміцеті в спп., 5 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат-метил, 375 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.*	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	
		цимоксаніл, 225 г/л +	0,05		не потр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04				
		продукт ферментації Актиноміцеті в спп., 5 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				

		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не потр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
11 0	Ридоміл Голд R 162 WG, BG			<i>Контроль за міддю та іпровалікарбом</i>									
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	виноград ²	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	2
		металаксил- М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	-	-	-	
		металаксил- М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	картопля ²	10,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	20	7	3	
		металаксил- М, 20 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	цибуля (ріпка)	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	14	7	3	
		металаксил- М, 20 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				

		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	кавуни	5,0 (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	
		металаксил- М, 20 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	томати ² (відкритий та закритий грунт)	5,0 (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	14	7	3	
		металаксил- М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	томатний сік	5,0 (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	-	-	-	
		металаксил- М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		хлорокис міді, 141 г/кг +	0,05 (по міді)	огірки (відкритий та закритий грунт)	5,0 (межа визн. ААС-0,5)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	14	7	3	
		металаксил- М, 20 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
11 1	Римон Фаст, КС			<i>Контроль за новалуроном та біфентрином</i>									
		новалурон, 50 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	3	2 (високостійк ий у воді)
		біфентрин, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				

		новалурон, 50 г/л +	0,01	ріпак (олія)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
11 2	Сантьяго, ТН			Контроль за тіаметоксаом									2 (високостійк ий у воді)
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.	
		дифенокназо л, 25 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		флудіоксоніл, 25 г/л	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	0,2/				
11 3	Саньджо, КС			Контроль за тіаметоксаом та лямбда-цигалотрином									
		тіаметоксам, 141 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	35	не потр.	4	2
		лямбда- цигалотрин, 106 г/кг	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л +	0,002	соняшник (олія)	не потр.*	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотрин, 106 г/кг	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
11 4	Сатурн Дуо, МД			Контроль за нікосульфуроном та мезотріоном									2 (високостійк ий у воді)
		нікосульфуро н, 40 г/л +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не потр.	не потр.	3	

		мезотріон, 55 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4				
		нікосульфуро н, 40 г/л +	2,0	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	-	-	-	
		мезотріон, 55 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4				
11 5	Серкадіс, КС	флуксапірокса д, 300 г/л	0,02	картопля ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	45	7	3	3 (високостійк ий у воді та грунті)
				виноград ²	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					35	7	3	
				виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
11 6	Синева, КС	міді сульфат триосновний, 345 г/л	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,028)	0,5/	0,003 - максимальна разова; 0,001 - середньо- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,016)					-	-	-	
				виноград	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,028)					30	7	3	
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ААС-ІЗП- 0,016)					-	-	-	
11 7	Сігнум, ВГ			Контроль за піраклостробіном та боскалідом									3 (високостійк ий у ґрунті)
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	томати ²	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	20	7	3	

		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	томатний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	капуста ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	35	7	3	
		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	суніця ²	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	14	7	3	
		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	суничний сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	вишні ²	0,25 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	40	7	3	
		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	вишневий сік	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,3)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	абрикоси ²	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,3)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	40	7	3	

		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,15 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	абрикосовий сік	0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,3)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклостробі н, 67 г/кг	0,03		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
11 8	Сіметра 325 SC, КС			Контроль за азоксистробіном та ізопіразамом									2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
		азоксистробін , 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	
		ізопіразам, 125 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,5	/0,005	0,001/ заг.-сан.	/0,4				
11 9	Сінан, КС			Контроль за дифеноконазолом та піраклостробіном									3 (високостійк ий у воді)
		дифеноконазо л, 130 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	40	не потр.	3	
		піраклостробі н, 130 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		дифеноконазо л, 130 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	35	не потр.	3	
		піраклостробі н, 130 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		дифеноконазо л, 130 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		піраклостробі н, 130 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
12 0	Скарабей, СЕ			Контроль за дифлубензурином та есфенвалераом									

		дифлубензу рн, 300 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,15 (межа визн. ГРХ-0,08)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	35	не потр.	4	3 (високостійк ий у воді)
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензу рн, 300 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензу рн, 300 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,06)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	35	не потр.	4	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензу рн, 300 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензу рн, 300 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,15 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	40	не потр.	4	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензу рн, 300 г/л +	0,02	ріпак (олія)	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	

		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензуро н, 300 г/л +	0,02	томати	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	30	10	4	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензуро н, 300 г/л +	0,02	томатний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензуро н, 300 г/л +	0,02	виноград	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	35	10	4	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
		дифлубензуро н, 300 г/л +	0,02	виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/3,0	/0,006	0,006/ заг.-сан.	/0,07	-	-	-	
		есфенвалерат, 88 г/л	0,003		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,0004	0,003/ орг.	/0,1				
12 1	Спукер, КС	метконазол, 60 г/л	0,001	ріпак (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.	50	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді та грунті)
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	

				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)					30	не потр.	3	
12 2	Сорател, КЕ			<i>Контроль за протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)</i>									З (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
		протіоконазол , 250 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1 (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)	30	не потр.	3	
				соняшник (насіння)	0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)					50	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	3	
12 3	Спліт Дуо, КС			<i>Контроль за дифеноконазолом та азоксистробіном</i>									З (високостійк ий у воді)
		дифеноконазо л, 125 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не потр.	3	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифеноконазо л, 125 г/л +	0,002	ріпак (олія)	не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифеноконазо л, 125 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не потр.	3	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				

		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	соя (олія)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не потр.	3	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4 (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		дифенокназо л, 125 г/л +	0,002	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
12 4	Старлент, СЕ			Контроль за тербутилазином та пропізохлором									3 (високостійк ий у воді)
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	

		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохлор, 360 г/л +	0,01	нут (зерно)	0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 190 г/л	0,003		0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
12 5	Стейт, СК	лямбда- цигалотрин, 250 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	30	не потр.	4	2
				ріпак (насіння)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	4	
				ріпак (олія)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,05)					-	-	-	

				соє (зерно)	0,02 (межа визн. ГРХ-0,02)					30	не потр.	4	
				соє (олія)	0,02 (межа визн. ГРХ-0,02)					-	-	-	
12 6	Стробі, ВГ	крезоксим- метил, 500 г/л	0,1	яблука ²	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.-сан.	/0,1	30	7	3	3
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					-	-	-	
12 7	Стробіфан, КЕ			Контроль за піраклостробіном та пропіконазолом									
		піраклостробі н, 130 г/л +	0,03	сосяшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді та грунті)
		пропіконазол, 230 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		піраклостробі н, 130 г/л +	0,03	сосяшник (олія)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
		пропіконазол, 230 г/л	0,04		не потр.*	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
12 8	Стронг, РК	хлормекват хлорид, 750 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ТШХ-0,05)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,02	0,2/ сан.-токс.	/0,2	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
12 9	Тамер, ВП	ацетаміприд, 100 г/кг	0,01	сосяшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	35	не потр.	3	2 (високостійк ий у воді)
				сосяшник (олія)	не потр.					-	-	-	
13 0	Тебуфан 500, КС			Контроль за карбендазимом та тебуконазолом									
		карбендазим, 250 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТШХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)

		тебуконазол, 120 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0					
13 1	Теламус, КЕ			Контроль за пропіконазолом, піраклостробіном та боскалідом										3 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не потр.	3		
		піраклостробі н, 167 г/л +	0,03		0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6					
		боскалід, 133 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4					
13 2	Тефуріцид 600, КЕ			Контроль за клетодимом та хізалофоп-п-тефурілом										3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		клетодим, 120 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	не потр.	3		
		хізалофоп- п-тефуріл, 40 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1					
		клетодим, 120 г/л +	3,0	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-		
		хізалофоп- п-тефуріл, 40 г/л	0,005		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,2	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1					
13 3	Тіасект Контрол, КС			Контроль за тіаметоксамом та альфа-циперметрином										3 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		тіаметоксам, 250 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	30	не потр.	4		
		альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03					
13 4	Голазин Ультра, СЕ			Контроль за S-метолахлором та тербутилазином										

		S-метолахлор, 468 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				2 (високостійк ий у воді)
		тербутилазин, 281 г/лн	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	
		S-метолахлор, 468 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	-	-	-	
		тербутилазин, 281 г/лн	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		S-метолахлор, 468 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутилазин, 281 г/лн	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	
		S-метолахлор, 468 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	-	-	-	
		тербутилазин, 281 г/лн	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
13 5	Толедо 75 FS, TH			<i>Контроль за флуоксастробіном, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)</i>									2 (алерген, високостійки й у воді та грунті)
		флуоксастробі н, 37,5 г/л +	0,007	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.	не потр.	не потр.	не потр.	
		протіоконазол , 37,5 г/л	0,001		0,1* (2) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				
13 6	Топмазин Плюс (Topmazin Plus), PK			<i>Контроль за топрамезоном та дикамбою</i>									3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,5	/0,002	0,002/ сан.-токс.	/0,3	не потр.	не потр.	3	
		дикамба, 160 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (олія)	не потр.	/0,5	/0,002	0,002/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	

		дикамба, 160 г/л	0,004		не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
13 7	Трегус 500, КЕ			<i>Контроль за сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти в перерахунку на трінексапак-етил</i>		<i>Контроль за трінексапак-етилом</i>		<i>Контроль за сумою трінексапак-етилу та трінексапак-кислоти в перерахунку на трінексапак-етил</i>					2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійки й у воді)
		трінексапак- етил, 500 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
13 8	Триггер, ВГ	трибенурон- метил, 200 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру)
				соняшник (олія)						-	-	-	
13 9	Туріл, ВГ	емаектин бензоат, 100 г/кг	0,001	яблука ²	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3	14	7	3	2 (високостійк ий у воді)
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
				капуста ²	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					14	7	3	
14 0	Ультралін, ВГ			<i>Контроль за цимоксанілом та азоксистробіном</i>									3 (високостійк ий у воді)
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не потр.	3	
		азоксистробін , 250 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		азоксистробін , 250 г/кг	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				

		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	soя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не потр.	3	
		азоксистробін , 250 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	soя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		азоксистробін , 250 г/кг	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
14 1	Уніко ККР, КЕ			<i>Контроль за флуроксипіром</i>		<i>Контроль за флуроксипір-метилом</i>		<i>Контроль за флуроксипіром</i>					3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійк ий у воді)
		флуроксипір- метил, 145 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ГРХ-0,025)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2	не потр.	не потр.	3	
		флорасулам, 200 г/л	0,05		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
14 2	Фавор, КС			<i>Контроль за імідаклопридом та дифеноконазолом</i>									3 (високостійк ий у воді)
		імідаклоприд, 333 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	не потр.	
		дифеноконазо л, 67 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		тебуконазол, 17 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
14 3	Флорасула м-Стар, КС	флорасулам, 200 г/л	0,05	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.	не потр.	не потр.	3	3
14 4	Флорацид Актив, ВГ			<i>Контроль за трибенурон-метилом та флорасуламом</i>									
		трибенурон- метил, 570 г/кг +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)

		флорасулам, 190 г/кг	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
14 5	Флубен- Стар, КС	флубендіамід, 480 г/л	0,003	кукурудза (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	30	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді та грунті)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
14 6	Флуксіс (Fluxis, SC), КС			Контроль за флутріафолом та азоксистробіном									2 (високостійк ий у воді та грунті)
		флутріафол, 125 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	30	не потр.	3	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		флутріафол, 125 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		флутріафол, 125 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	35	не потр.	3	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		флутріафол, 125 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		азоксистробін , 250 г/л	0,03		не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				

14 7	Флумайт, КС	дифловідазин (флуфензин), 200 г/л	0,008****	соє (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ-0,001)	0,001/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,001)	/0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	40	не потр.	3	2
				соє (олія)	не потр.								
14 8	Флутридезі н, ТН			Контроль за тираном									3 (високостійк ий у воді та грунті)
		флутриафол, 30 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не потр.	не потр.	3	
		тиран, 400 г/л	0,005		0,05* (межа визн. ТШХ-0,05)	0,5/	0,05 - максимальна разова; 0,02 - середньо- добова/	0,01/ сан.-токс.	/0,2				
14 9	Фокс 325 SC, КС			Контроль за трифлуксистробіном, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)									2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високостійк ий у воді)
		трифлукси- стобін, 150 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	3	
		протіоконазол , 175 г/л	0,001		0,1* (2) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				
		трифлукси- стобін, 150 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.*	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		протіоконазол , 175 г/л	0,001		не потр.*	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				
15 0	Форапро, КЕ			Контроль за фенпропідіном, протіоконазолом (1) та протіоконазолом-дестіо (2)									3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високостійк ий
		фенпропідин, 250 г/л +	0,005	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,03	0,03/ заг.-сан.	/0,4	30	не потр.	3	
		протіоконазол , 175 г/л	0,001		0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг.-сан.	/0,2 (2)				

													у воді та ґрунті)
15 1	Харвіста 1.3, КС	метилцикло- пропен, 1,3 % (17,15 г д.р./л)	0,0009	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/50,0	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	1	1	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
15 2	Хоук, ВГ			<i>Контроль за флудіоксоніом та ципродинілом</i>									2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		флудіоксоніл, 250 г/кг +	0,015	томати	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	14	7	3	
		ципродиніл, 370 г/кг	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,05	0,02/ заг.-сан.	/0,2				
		флудіоксоніл, 250 г/кг +	0,015	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	
		ципродиніл, 370 г/кг	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,05	0,02/ заг.-сан.	/0,2				
		флудіоксоніл, 250 г/кг +	0,015	лохина	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	14	7	3	
		ципродиніл, 370 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,02/ заг.-сан.	/0,2				
15 3	Циліон ФС, ТН			<i>Контроль за імідаклопридом та дифеноконазолом</i>		<i>Контроль за імідаклопридом, дифеноконазолом та флудіоксонілом</i>		<i>Контроль за імідаклопридом та дифеноконазолом</i>					2 (високостійк ий у воді)
		дифеноконазо л, 25 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	не потр.	не потр.	не потр.	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		імідаклоприд, 350 г/л	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				

		дифеноконазо л, 25 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		флудіоксоніл, 25 г/л +			0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		імідаклоприд, 350 г/л			0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		дифеноконазо л, 25 г/л +		соє (олія)	не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		флудіоксоніл, 25 г/л +			не потр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		імідаклоприд, 350 г/л	0,002		не потр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
15 4	Ширма, КС	флуазинам, 500 г/л	0,01	виноград	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2	50	7	3	3
				виноградний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
				яблука	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					60	7	3	
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)					20	7	3	
15 5	Штефтрел, РК	клопіралід, 300 г/л	0,15	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ/УФ- 0,1)	2,0/	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	

156	ЮНІ-АЦЕТАМІП-РИД 200, КС	ацетаміприд, 200 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	не потр. (передпосів на обробка)	не потр.	3	2 (високостійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					40	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					30	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
157	ЮНІ-КАРБЕНД А-ЗИМ 500, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не потр.	3	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					45	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*								
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					50	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.*								
158	ЮНІ-ЛЯМБДА 100, СК	лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	35	не потр.	4	3 (високостійкий у воді)

				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не потр.	4	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					40	не потр.	4	
				соя (олія)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					30	не потр.	4	
				кукурудза (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
15 9	ЮНІ- ПРОТІО 480, КС			<i>Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та протіоконазолом (2)</i>									
		протіоконазол , 480 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)	30	не потр.	3	3 (високостійк ий у воді)
				сояшник (насіння)	0,1 (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	не потр.	3	
				сояшник (олія)	не потр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,1*** (1) (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)					30	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
16 0	Ямато, СЕ			<i>Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом та тетраконазолом</i>		<i>Контроль за тіофанат-метилом та тетраконазолом</i>		<i>Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом та тетраконазолом</i>					2 (високостійк ий у воді та грунті)

		тіофанат-метил, 233 г/л +	0,08	буряки цукрові	0,5* (межа визн. ТШХ-0,5)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	20	7	3	
		тетраконазол, 70 г/л +	0,002		0,03 (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,3	/0,001	0,005/ сан.-токс.	/0,1				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТШХ-0,06)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				

¹ Препарат рекомендовано для застосування авіаційним методом.

² Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.

* Державні санітарні правила та норми «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 20 вересня 2001 р. № 137.

** EU Pesticides database.

*** Codex Maximum Residue Limits (MRLs), Codex Alimentarius Commission.

**** Нормативи тимчасові.».

**В.о. Генерального директора
Директорату громадського здоров'я
та профілактики захворюваності**

Олексій ДАНИЛЕНКО